

El genotipado KIR-HLAC permite establecer el riesgo de rechazo del embrión por parte del sistema inmune de la madre.

El sistema inmune (SI) humano está preparado para eliminar todo aquello que reconoce como extraño a fin de ofrecer una protección apropiada contra patógenos. Durante el embarazo, el SI de la madre se enfrenta a un elemento, el embrión, que presenta antígenos "extraños" (procedentes del padre, en el caso de embarazos con óvulos propios; o del padre y la donante, en casos de donación de los óvulos). Que la madre sea capaz de "tolerar" al embrión a pesar de reconocerlo como extraño es algo fundamental para el éxito de la gestación.


Varios estudios recientes han indicado que alteraciones en los mecanismos inmunoreguladores de la respuesta materna al feto podrían ser responsables de algunos casos de infertilidad femenina, fallo de implantación o aborto¹⁻⁴.

El genotipado KIR-HLAC es una herramienta que permite evaluar los riesgos de rechazo del embrión por parte del sistema inmune materno, y así tomar las medidas necesarias para que se dé un embarazo sin problemas.

METODOLOGÍA



Extracción de 4 ml de sangre de la pareja



Refrigeración a 4°C



Envío a temperatura ambiente



Genotipado KIR y HLAC



Resultado en 15 días laborales

¿Qué es el genotipado KIR-HLAC?

Para que la gestación se desarrolle de manera correcta son fundamentales un embrión de calidad, un útero preparado para recibirlo y una interacción entre ambos que permita que el embrión anide y se desarrolle correctamente. Para que esto se lleve a cabo debe existir cierta tolerancia materna hacia el embrión. Esto se consigue gracias a la interacción del embrión con las células del sistema inmune materno presentes en el útero (llamadas células NK uterinas). Estas células reconocen al embrión a través de unos receptores situados en su superficie llamados KIR, que se unen a unos fragmentos de identificación que se encuentran en la superficie del embrión llamados HLA-C, uno heredado de la madre y otro heredado del padre.

Diversos estudios han demostrado que ciertas combinaciones de KIR y HLA-C son más propensas a dar lugar a problemas en el embarazo¹⁻⁵.

Mediante el genotipado KIR-HLAC se puede determinar si entre los receptores uterinos KIR y el HLA-C presentado por el embrión existe una buena compatibilidad. Si es así, el proceso de tolerancia materno-fetal se desarrollará adecuadamente y el embarazo evolucionará sin complicaciones. De lo contrario, si no existe esta compatibilidad entre los HLA-C embrionarios y los receptores uterinos KIR, el proceso de aceptación embrionaria se verá comprometido y con ello la evolución de la gestación.

¿Para qué sirve el genotipado KIR-HLAC?

El genotipado de KIR-HLAC nos permitirá:

- Encontrar la causa de los abortos de repetición y fallo de implantación.
- Decidir el número óptimo de embriones a transferir.
- Prevenir posibles complicaciones durante el embarazo.
- La elección de un donante compatible con la futura gestante, tanto en el caso de donación de semen como de ovocitos.



¿Cómo se realiza este test?

El genotipado KIR-HLAC se realiza a partir del ADN de la pareja. Para ello, se requiere de una muestra de 4 ml sangre de cada individuo.

La muestra de sangre, una vez extraída, debe ser refrigerada a 4°C y enviada a nuestro laboratorio a temperatura ambiente. En el laboratorio realizaremos el test extrayendo previamente el material genético de la muestra de sangre. Hecho esto se procederá al genotipado.

En una pareja normalmente se realizará un análisis de KIR y HLA-C de la madre gestante, y un análisis de HLA-C del padre, que aporta el semen.

En caso de donación de óvulos o espermatozoides sería necesario genotipar HLA-C en el/la donante.

¿Qué se puede hacer si una pareja es incompatible?

Las incompatibilidades inmunológicas en el ámbito de la fertilidad pueden causar diferentes procesos entre los que destacamos los fallos en la implantación, los abortos de repetición y la preeclampsia. Diferentes estudios han comprobado que las patologías graves asociadas al embarazo aumentan significativamente en mujeres gestantes con una combinación materno-fetal incompatible^{1,3,5}. Cuando la combinación de KIR materno y HLA-C del futuro embrión es incompatible hay varias medidas recomendadas.

- Estaría indicada la transferencia de un único embrión para evitar exponer a la madre a una carga doble de HLA-C incompatible.
- Puede además preescribirse un tratamiento inmunomodulador a la futura madre.
- En el caso de necesitar donante, de semen u ovocitos, es recomendable que su genotipo HLA-C sea compatible con el KIR materno para asegurar de que el embrión también lo sea.

1. Moffet A, Colucci F. J Clin Inves. 2014; 124 (5):1872-1879.
2. Alecsandru D y col. Hum Reprod. 2014 Dec;29(12):2637-43.
3. Alecsandru D, García-Velasco JA. Fertil Steril. 2017 Jun; 107(6):1273-1278.
4. Morin SJ y col. Fertil Steril. 2017 Mar;107(3):677-683.e2.
5. Moffet A, Hiby SE. Placenta. 2007; 28 (Supp A): S51-6.

iGLS

Servicios de Genética Avanzada
+34 965 118 029 • info@igls.net
www.igls.net